

아노로62.5엘립타 사용 설명서

♣ 효과

아노로62.5엘립타는 **기관지를 확장**시켜서 증상을 가라앉혀주는 흡입제로, 규칙적으로 사용하여 기관지가 좁아지는 것을 예방합니다.

♣ 사용횟수

1일 1회, 매일 같은 시간에 흡입합니다.

♣ 사용방법



약을 흡입할 때, **세게 흡입하는 것이 좋습니다.**

♣ 부작용

- ① 기침, 입마름, 두통, 현기증 : 드물게 나타날 수 있습니다.
- ② 드물지만 가슴 통증이 15분 이상 지속되거나 가슴이 빠르게 두근거릴 때, 호흡이 어려울 때는 즉시 의사나 약사와 상의하십시오.
- ③ 드물지만 소변보는데 어려움이 있는 경우에는 의사나 약사와 상의하십시오.

♣ 주의사항

- ① 반드시 **흡입하기 직전**에 덮개를 열어 준비합니다.
- ② 흡입 시 느낌이 거의 없으나 정확히 투여되고 있으니 여러 번 사용하지 마세요.
- ③ 용량 확인 방법
 - 한 통으로 **30번** 흡입할 수 있습니다. **(30일분)**
 - 약물잔여횟수창이 "**0**" 이면 약을 다 사용했음을 의미합니다.
- ④ 덮개를 닫기 전에 마른 휴지로 흡입구 주변을 닦아 줍니다.
- ⑤ 호일 포장을 제거한 후 6주까지 사용할 수 있습니다.



가톨릭대학교

의정부성모병원

복약상담실 031) 820-3957 [월~금요일 오전 8시~ 오후 5시까지]